



INFORME TÉCNICO N° 01/2021

VACINA CONTENDO O VÍRUS SARS-COV2 - Sinovac /Butantan e AstraZeneca /Fiocruz Público Inicial

- a) Equipe de vacinação que realiza a aplicação no grupo prioritário.
- b) Idoso residente em asilo e abrigos
- c) Trabalhador de saúde, público ou privado, envolvidos diretamente no atendimento aos casos de COVID-19

OBS: Todos os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação seguindo cronograma gradativo, conforme disponibilidade de vacinas.

- **Vacinas em uso:**
 - Vacina Sinovac/Butantan: Vírus Inativado
 - Vacina AstraZeneca/Fiocruz: Vacina covid-19 (recombinada)
- **Apresentação:**
 - Vacina Sinovac/Butantan: Vírus Inativado – Frasco monodose (Uso imediato após aberto)
 - Vacina AstraZeneca/Fiocruz: Vacina covid-19 (recombinada) – Frasco-ampola com 5ml (10 doses) cada. (Validade de 6 horas após abertura do frasco)
- **Aplicação/Conservação**
 - a) Aplicação Via IM (Deltóide E) após homogeneização do frasco. Conservação entre + 2^oa 8^o C
 - b) Intervalo entre as doses (D1 e D2) :
Vacina Sinovac/Butantan: 21 dias entre as doses
Vacina AstraZeneca/Fiocruz: 90 dia entre as doses
- **Administração simultânea:**
 - a) Recomenda-se intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas COVID-19 e as demais vacinas do Calendário Nacional.
- **Contra-indicação:**
 - a) Infecção em atividade por COVID-19 (recomenda-se adiar a vacinação por 4 semanas)
 - b) Gestantes e lactantes. Caso descobrir a gravidez após a vacinação, notificar como Erro de Imunização (Formulário EAPV) para acompanhamento.
 - c) Pessoas menores de 18 anos
 - d) Imunocomprometidos, tratamento oncológicos, transplantados (somente com autorização escrita do médico assistente)
 - e) Alergia a qualquer um dos componentes desta Vacina
 - f) Paciente com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas.
- **Precauções:**
 - a) O uso com cautela deve ser feito nos seguintes casos: histórico familiar e pessoal de convulsão, portadores de doenças crônicas, história de epilepsia e alergias.
 - b) Pessoas que utilizam medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes orais (somente com autorização escrita do médico assistente)
- **Reações Adversas:**
 - a) Local : dor, hematoma, prurido, eritema, edema local, endureção.
 - b) Sistêmica : náuseas, diarreia, cefaléia, fadiga, mialgia, tosse, artralgia, prurido, rinorreia, odinofagia, congestão nasal, vômito, calafrios, diminuição de apetite, reação alérgica, astenia, tontura, equimose, hipotermia, desconforto nos membros.
OBS: Nestes casos deverá ser preenchida a Ficha de Eventos Adversos e encaminhá-la, mais rápido possível à Central de Vacinas.
- **Registro de Doses:**

Enviar diariamente, até 14h, o Consolidado de doses aplicadas na Unidade.
As Unidades públicas deverão registrar todas as doses aplicadas no **Sistema Novo do SIPNI**

