



ESPOROTRICOSE

LUCIANA FERRADOSA

**ESPOROTRICOSE É A
MICOSE SUBCUTÂNEA
MAIS COMUM NO BRASIL**

Sporothrix spp.

- *S. schenckii*
- *S. brasiliensis*
- *S. globosa*
- *S. luriei*

MECANISMO DE TRANSMISSÃO

- Contaminação através do solo infectado
 - Atividades de jardinagem
- Mordedura ou arranhadura de gato infectado



DIAGNOSTICO

- Micológico: Exame Direto e Cultura
- Métodos auxiliares:
 - Sorologia
 - Histopatologia

- Processo inflamatório com formação de granuloma que raramente revela elementos fúngicos (leveduriformes) sendo a presença de corpos asteróides fortemente sugestivos.

Inoculação Traumática

Pápula/ Pústula/ Nódulo/
Úlcera

Disseminação Linfática
(aspecto esporotricóide)

FORMAS CLÍNICAS

LINFOCUTÂNEA





FORMAS CLÍNICAS


FIXA

FORMAS CLÍNICAS

CUTÂNEA DISSEMINADA



Presença de lesões eritemato papulo crostosas disseminadas principalmente em região nasal e frontal



Lesões papulosas com halo eritematoso e centro claro contendo crostas, algumas agrupadas, localizadas em ambas as pernas



FORMAS CLÍNICAS

DISSEMINADA

Ulceração em mama esquerda e exulceração em braço esquerdo



TRATAMENTO

Opção	Posologia	Manejo	Vantagens	Desvantagens
Itraconazol (Escolha)	100mg/dia	1 cáps pós almoço ou jantar c/ suco ácido ou água. S/ melhora após 2m: aumentar p/ 2 caps	Poucos efeitos adversos, posologia	Custo, Interações medic.
Alternativas Terbinafina	250mg/dia	1 comp/dia. 2 comp após 2m sem melhora;	Posologia	Custo
Sol. Sat. Iodeto Potássio	40 a 50 gts 3x/dia	5 gts/tomada, aumentar 1 gt/tomada/dia até dose alvo	Custo	Ef. Adversos, posologia

TRATAMENTO DE CRIANÇAS

- Itraconazol – 5mg/kg/dia
 - Sol. Oral manipulada 40mg/mL
- Alternativa
- KI – 1 gota 3x/dia
 - <20kg = 10 gotas 2x/dia
 - 20 a 40kg = 15 gotas 2x/dia
 - >40kg = 20 a 25 gotas 2x/dia

TRATAMENTO
DE FORMAS
DISSEMINADAS

- Anfotericina B desoxicolato: 0,5 a 1 mg/kg/dia
- Ou
- Anfotericina B lipossomal: 3 a 5 mg/kg/dia

TRATAMENTOS ADJUVANTES

- Criocirurgia
- Punção/ drenagem
- Curetagem



TRATAMENTO EM GESTANTES

- Localizada (fixa, linfocutânea)
 - Termoterapia com calor local: 20 min/vez, 3 vezes ao dia
 - Adjuvantes: Criocirurgia, Punção/drenagem, Curetagem

