



## ESTRATÉGIA DA CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / 2021

DE 1 A 29 DE OUTUBRO  
DIA “D” 16 DE OUTUBRO

### Público Alvo:

Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias) não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o **Calendário Nacional de Vacinação**.

#### 1. CONTRA INDICAÇÕES GERAIS:

- Febre (acima de 38°C);
  - Hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina (Ex: Eritromicina ou Estreptomicina);
  - Crianças em uso de corticóides **SOMENTE** em doses imunossupressoras;
  - Crianças em quimioterapia antineoplásicas;
  - Transplantado de medula óssea;
  - Imunodeficiência Congênita ou Adquirida;
- ❖ Crianças com alergia **grave** a ovo deverão receber a vacina Tríplice Viral nos Hospitais de Emergência/Urgência ou CRIE.

#### 2. EVENTOS ADVERSOS:

- LOCAIS: Dor, vermelhidão e edema.
- MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS: Febre >39,5°C, cefaléia, irritabilidade, exantema, artralgia, reação anafilática, meningite, encefalite e outras manifestações neurológica, Paralisia flácida aguda.

#### 3. VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

- Via Oral
- Via Subcutânea
- Via Intramuscular

### **LEMBRETE:**

- Crianças de 06 meses a 11 meses e 29 dias – deverá ter **01 dose ( D0 ) de Tríplice Viral.**
- Crianças de 12 meses a 14 meses e 29 dias – deverá ter **01 dose ( D1 ) de Tríplice Viral.**
- Crianças de 15 meses a adolescentes de 19 anos, 11 meses e 29 dias – deverão ter **02 doses ( D1 e D2 ) de Tríplice Viral,** com intervalo mínimo de 30 dias.
- Crianças de 6 a 8 meses administrar Tríplice Viral (laboratórios Biomanguinhos ou GSK)
- Crianças a partir de 9 meses administrar a Tríplice Viral ( Laboratório Serum Institute of India )
- Crianças e adolescentes portadores de alergias à proteína do leite, administrar vacina Tríplice Viral (Laboratório Biomanguinhos ou GSK).
- A vacina Febre Amarela **não deve ser administrada simultaneamente com a vacina Tríplice viral ou Tetra Viral em crianças menores de 2 anos primovacinados.** Respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses.

#### 4. VACINA CONTRA COVID-19 E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO:

Conforme Nota Técnica Nº 1203/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS , o Ministério da Saúde não mais exige o intervalo mínimo entre as vacinas do COVID-19 e as demais vacinas em uso no país. Desta forma as vacinas **covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo.**

#### 5. Notificação dos Eventos Adversos pós-vacinais (EAPV):

- Notificar todos os eventos graves, raros e ou inusitados;
- Evento relacionado a erro de imunização (programático);
- Eventos inesperados e que sua relação com a vacina não é clara, ocorridos dentro de 30 dias após a vacinação.

#### 6. Todas as doses aplicadas deverão ser **registradas nominalmente** no SIPNI ou e-SUS.



Quadro 1. Vacinas do Calendário da Criança e esquemas até os sete anos de idade.

| VACINAS                        | DOSES DA VACINA E IDADE RECOMENDADA NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO |                                                           | ORIENTAÇÕES PARA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO/CADERNETA DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO DE CRIANÇAS COM ESQUEMA VACINAL INCOMPLETO OU NÃO VACINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ESQUEMA DE VACINAÇÃO                                           | IDADE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BCG</b>                     | Dose única                                                     | Ao nascer                                                 | Criança não vacinada, administrar uma dose da vacina até quatro anos, 11 meses e 29 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hepatite B</b>              | Dose ao nascer                                                 | Ao nascer                                                 | Criança não vacinada ao nascer, administrar uma dose da vacina hepatite B até um mês de idade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penta</b>                   | 3 doses                                                        | 1ª dose: 2 meses<br>2ª dose: 4 meses<br>3ª dose: 6 meses  | Criança de dois meses até seis anos, 11 meses e 29 dias - Iniciar / complementar / concluir o esquema básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Polio inativada</b>         | 3 doses                                                        | 1ª dose: 2 meses<br>2ª dose: 4 meses<br>3ª dose: 6 meses  | Criança a partir de dois meses a menor de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) - Iniciar / complementar / concluir o esquema básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Polio oral</b>              | 2 reforços                                                     | 1º reforço: 15 meses<br>2º reforço: 4 anos                | Criança a partir dos 15 meses a menor de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) - Iniciar / complementar / concluir o esquema de vacinação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rotavírus</b>               | 2 doses                                                        | 1ª dose: 2 meses<br>2ª dose: 4 meses                      | Criança com idade de um mês e 15 dias a três meses e 15 dias poderá receber a 1ª dose<br>Criança com idade de três meses e 15 dias até sete meses e 29 dias poderá receber a 2ª dose desta vacina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pneumocócica 10-valente</b> | 2 doses<br>1 reforço                                           | 1ª dose: 2 meses<br>2ª dose: 4 meses<br>Reforço: 12 meses | Vacina pode ser administrada em criança a partir dos dois meses até os quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias).<br>Crianças que iniciaram o esquema primário após 4 (quatro) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose (O reforço deve ser administrado entre 12 meses e 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias)<br>Criança entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade com esquema completo de 2 (duas) ou 3 (três) doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço<br>Crianças sem comprovação vacinal, entre 12 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, administrar dose única<br>Para as crianças de 2 (dois) meses a menores de 5 (cinco) anos de idade, com indicação clínica especial manter |



|                                                                   |                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                   |                                                              | esquema de 3 (três) doses e reforço, conforme as indicações do CRIE                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Meningocócica C</b>                                            | 2 doses<br>1º reforço                                             | 1ª dose: 3 meses<br>2ª dose: 5 meses<br>1º Reforço: 12 meses | Vacina pode ser administrada em criança a partir dos três meses de idade até os quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias).                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Criança que iniciou o esquema após cinco meses de idade deve completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose                                                             |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Criança entre um a quatro anos de idade com esquema básico de duas doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço                                                                                                                                                  |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Criança entre um e quatro anos de idade, sem comprovação vacinal, administrar uma única dose                                                                                                                                                                                |
| <b>Febre amarela</b>                                              | 1 dose<br>Reforço                                                 | Dose: 9 meses<br>Reforço: 4 anos                             | Crianças entre nove meses e quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias): Administrar 1 (uma) dose e dose de reforço aos quatro anos de idade.                                                                                                                    |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Crianças entre cinco e seis anos de idade, não vacinada ou sem comprovante de vacinação: Administrar 1 (uma) dose única.                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Crianças entre cinco e seis anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade: Administrar uma dose de reforço. Respeitar intervalo mínimo de 30 dias, entre a dose e o reforço.                                                          |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | <b>ATENÇÃO:</b><br>Esta vacina está contraindicada para crianças menores de seis meses!                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola)</b>          | 2 doses (1ª dose com SCR e 2ª dose com SCRv)                      | 12 meses                                                     | Criança de 12 meses até seis anos, 11 meses e 29 dias deverá receber a 1ª dose da tríplice viral e agendar a 2ª dose da vacina tetra viral ou tríplice viral mais varicela (atenuada), conforme a disponibilidade da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses |
| <b>Tetra viral (SCRv - sarampo, caxumba e rubéola e varicela)</b> | 1 dose (corresponde a segunda dose da SCR e primeira de varicela) | 15 meses                                                     | A vacina tetra viral está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade entre 15 meses e 4 anos 11 meses e 29 dias                                                                                                                                              |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Criança a partir de cinco anos de idade não vacinada ou sem comprovante de vacinação deverá receber a 1ª dose da tríplice viral e agendar a 2ª dose da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses                                                       |
| <b>DTP</b>                                                        | 2 reforços                                                        | 1º reforço: 15 meses<br>2º reforço: 4 anos                   | Criança até os 4 (quatro) anos de idade. Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a 3ª dose do esquema básico; intervalo mínimo de 6 (seis) meses entre os reforços                                                                       |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Criança de 15 meses até seis anos, 11 meses e 29 dias sem nenhum reforço, administrar o 1º reforço e agendar o segundo reforço. Atentar para o intervalo de 6 meses entre as doses                                                                                          |
|                                                                   |                                                                   |                                                              | Crianças com 6 anos sem nenhuma dose de reforço administrar o 1º reforço. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, agendar dT                                                                                                         |



|            |        |          |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |          | para 10 anos após esse primeiro reforço. Neste caso estas crianças ficam liberadas do segundo reforço.                                                                                                                 |
| Hepatite A | 1 dose | 15 meses | Criança a partir de 15 meses até quatro anos 11 meses e 29 dias deverá receber uma dose.                                                                                                                               |
| Varicela   | 1 dose | 4 anos   | Crianças de 4 anos até 5 anos, 11 meses e 29 dias deverá receber uma dose de varicela. Corresponde à segunda dose da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral ou tríplice viral mais varicela aos 15 meses. |

**ATENÇÃO:** Crianças que se encontrarem em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Vacinação Simultânea: A vacina febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 (dois) anos de idade. O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Para a criança que recebeu anteriormente as vacinas tríplice viral e febre amarela, não há evidências de interferência na imunogenicidade entre elas, as duas poderão ser administradas simultaneamente ou sem intervalo mínimo entre as doses. Se a criança recebeu apenas uma das vacinas (tríplice viral ou febre amarela), estabelecer preferivelmente o intervalo de 30 dias entre as doses (mínimo 15 dias).



**Quadro 2. Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Calendário do Adolescente.**

| VACINAS                  | DOSES DA VACINA E IDADE RECOMENDADA NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO                         |       | ORIENTAÇÕES PARA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO/CADERNETA DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ESQUEMA VACINAL INCOMPLETO OU NÃO VACINADA                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ESQUEMA DE VACINAÇÃO                                                                   | IDADE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hepatite B               | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal                          | -     | Criança e adolescente não vacinada com a vacina hepatite B ou com a penta; e adolescente sem comprovação vacinal deverá receber três doses da vacina hepatite B com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose (zero, um e seis meses) |
|                          |                                                                                        |       | Criança e adolescente com esquema vacinal incompleto: não necessita reiniciar o esquema, apenas completá-lo conforme situação encontrada                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                        |       | Gestante adolescente não vacinada ou com esquema incompleto deve ser vacinada com a vacina hepatite B de acordo com a situação vacinal, iniciando, continuando, ou completando o esquema. A vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em qualquer idade gestacional           |
| Febre amarela            | Dose única                                                                             | -     | Crianças ou adolescentes a partir de sete anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Administrar 1 (uma) dose única                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                        |       | Crianças ou adolescentes a partir de sete anos de idade, que receberam uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade: Administrar uma dose de reforço. Respeitar intervalo mínimo de 30 dias, entre a dose e o reforço                                                                      |
|                          |                                                                                        |       | Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes e Nutrízes que estejam amamentando crianças menores de 6 (seis) meses de vida                                                                                                                                                                    |
| Tríplice viral           | Iniciar ou completar 2 doses, de acordo com histórico vacinal                          | -     | Criança ou adolescente não vacinado ou com esquema incompleto, deve ser vacinado com a vacina tríplice viral conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses                                                                                                  |
|                          |                                                                                        |       | Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Difteria e tétano adulto | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacina<br>Reforço a cada 10 anos | -     | Criança a partir de sete anos de idade ou adolescente não vacinado ou sem comprovação vacinal para difteria e tétano, administrar três doses com intervalo de 60 dias entre elas, mínimo de 30 dias                                                                                                   |
|                          |                                                                                        |       | Criança ou adolescente com esquema vacinal incompleto para difteria e tétano, deve ser vacinada continuando ou completando o esquema de três doses, considerando as doses anteriores, com intervalo de 60 dias entre elas, mínimo de 30 dias                                                          |



|                    |                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 |                                                      | Na gestante sem história prévia de vacinação administrar a vacina a partir da comprovação da gravidez, em qualquer período gestacional. Completar o esquema vacinal, preferencialmente até 20 dias antes da data provável do parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meningocócica ACWY | 1 dose          | 11 e 12 anos                                         | Adolescentes de 11 e 12 anos de idade, não vacinado ou sem comprovante de vacinação: administrar 1(um) reforço ou dose única de acordo com a situação vacinal encontrada.<br>A vacina meningocócica ACWY (conjugada) não está indicada para gestantes e para aquelas que estiverem amamentando. No entanto, diante do risco de contrair a doença, a relação risco benefício deve ser avaliada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HPV quadrivalente  | 2 doses         | Meninas: de 09 a 14 anos<br>Meninos: de 11 a 14 anos | Meninos e meninas que receberam a primeira dose e não completaram o esquema vacinal, mesmo após o período de seis meses, devem receber a segunda dose<br>Se o adolescente recebeu a primeira dose da vacina aos 14 anos de idade, a segunda dose deverá ser administrada com um intervalo mínimo de seis meses. Não há intervalo máximo recomendado entre as doses, no entanto um intervalo não superior a 12-15 meses é sugerido para completar o cronograma prontamente<br>Não administrar primeira dose para adolescentes maiores de 14 anos, 11 meses e 29 dias (15 anos). Para adolescentes de 15 anos, só deverá ser completado esquema vacinal (segunda dose)<br>Meninas que já completaram o esquema vacinal com a vacina bivalente não devem ser revacinadas<br>Atenção: Esta vacina está contraindicada para gestantes. |
| Varicela           | 1 ou duas doses | A partir dos 7 anos                                  | Criança ou adolescente <u>indígena</u> a partir dos sete anos de idade não vacinado ou sem comprovação vacinal deve receber uma dose ou duas doses de vacina varicela (atenuada) a depender do laboratório produtor.<br>Atenção: Esta vacina é contraindicada para gestantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dTpa               | 1 dose          | -                                                    | Considerar que independente do histórico de vacinação com dT, a gestante deve receber uma dose de dTpa em cada gestação.<br>Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ATENÇÃO:** Crianças que se encontrarem em situações ou condições clínicas especiais deverão ser avaliadas e vacinadas se houver indicação, pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). Para informações sobre precauções, contraindicações e outras particularidades, acessar a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação.



## 5. Conservação e validade das vacinas após abertura

As vacinas disponibilizadas na Campanha Nacional de Multivacinação devem ser conservadas pela instância local, rigorosamente, à temperatura entre +2°C e +8°C, para manutenção da qualidade, segurança e eficácia das vacinas. Com relação à validade, após a abertura do frasco, esta pode variar de laboratório para laboratório. Os prazos para utilização das vacinas devem ser adotados nos postos fixos e volantes conforme o Quadro 3:

**Quadro 3. Prazo para utilização das vacinas após abertura do frasco, Brasil, 2021.**

| VACINA                                                                                                                | LABORATÓRIO                      | PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DO FRASCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vacina adsorvida difteria e tétano adulto                                                                             | Serum Institute of India         | 28 dias                                                   |
|                                                                                                                       | Biological                       | 4 semanas                                                 |
|                                                                                                                       | Biofarma                         | 28 dias                                                   |
| Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis                                                                         | Serum Institute of India         | 28 dias                                                   |
|                                                                                                                       | Biofarma                         | 4 semanas                                                 |
|                                                                                                                       | Biological                       | 28 dias*                                                  |
| Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular)                                                              | Instituto Butantan               | Unidose - Uso imediato                                    |
| Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e <i>Haemophilus influenzae b</i> (conjugada) | Panacea                          | Unidose - Uso imediato                                    |
|                                                                                                                       | Serum Institute of India         | Unidose - Uso imediato                                    |
|                                                                                                                       | Biological                       | 28 dias*                                                  |
| Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil                                                                      | Instituto Butantan               | Unidose - Uso imediato                                    |
| Vacina BCG                                                                                                            | Fundação Atilauro de Paiva (FAP) | 6 horas                                                   |
|                                                                                                                       | Serum Institute of India         | 6 horas                                                   |
| Vacina febre amarela (atenuada)                                                                                       | Bio-Manguinhos                   | 6 horas                                                   |
| Vacina hepatite B (recombinante)                                                                                      | Instituto Butantan               | 15 dias                                                   |
|                                                                                                                       | Instituto Butantan/LG            | 10 dias                                                   |
|                                                                                                                       | Serum Institute of India         | 28 dias                                                   |
| Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)                                                             | Instituto Butantan               | Unidose - Uso imediato                                    |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,  
COORDENADORIA DE IMUNOBIOLOGICOS



|                                                               |                            |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vacina meningocócica C (conjugada)</b>                     | Fundação Ezequiel Dias     | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |
| <b>Vacina meningocócica ACWY (conjugada)</b>                  | Sanofi Medley Farmacêutica | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |
|                                                               | GlaxoSmithKline            | Unidose - Uso imediato. Possui estabilidade até 8 horas a 25°C                                                                                                   |
|                                                               | Pfizer                     | Unidose - Uso imediato. Possui estabilidade por 8 horas a 30°C                                                                                                   |
| <b>Vacina pneumocócica 10 - valente (conjugada)</b>           | Bio-Manguinhos             | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |
| <b>Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada)</b>                   | Bio-Manguinhos             | 5 dias                                                                                                                                                           |
| <b>Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)</b>               | Bio-Manguinhos             | 28 dias                                                                                                                                                          |
| <b>Vacina rotavírus humano G1P[8] (atenuada)</b>              | Bio-Manguinhos             | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |
| <b>Vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada)</b>           | Bio-Manguinhos             | Após a reconstituição, recomenda-se o uso imediato. No entanto, foi demonstrada a estabilidade, entre 2°C a 8°C, por até 8 horas após a reconstituição           |
|                                                               | Serum Institute of India   | 6 horas                                                                                                                                                          |
|                                                               | Merck Sharp&Dome           | 8 horas                                                                                                                                                          |
| <b>Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)</b> | Bio-Manguinhos             | Unidose - Após a reconstituição, recomenda-se o uso imediato. No entanto, foi demonstrada a estabilidade, entre 2°C a 8°C, por até 8 horas após a reconstituição |
| <b>Vacina varicela (atenuada)</b>                             | Merck Sharp&Dome           | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |
|                                                               | <b>GlaxoSmithKline</b>     | Unidose - A vacina reconstituída pode ser mantida em temperatura ambiente (25°C) por até 90 minutos ou em refrigerador (+ 2°C a + 8°C) por até 8 horas           |
|                                                               | Green Cross                | Unidose - Uso imediato                                                                                                                                           |

\*A OMS recomenda que os frascos abertos desta vacina possam ser mantidos para uso em sessões de imunização subsequentes (até um máximo de 28 dias), link de acesso: [https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/prequalified-vaccines?field\\_vaccines\\_effective\\_date\\_%5Bdate%5D=&field\\_vaccines\\_effective\\_date\\_1%5Bdate%5D=&field\\_vaccines\\_name=&field\\_vaccines\\_manufacturer%5B0%5D=Serum%20Institute%20of%20India%20Pvt.%20Ltd.&search\\_api\\_views\\_fulltext=&field\\_vaccines\\_number\\_of\\_doses=&p age=1](https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/prequalified-vaccines?field_vaccines_effective_date_%5Bdate%5D=&field_vaccines_effective_date_1%5Bdate%5D=&field_vaccines_name=&field_vaccines_manufacturer%5B0%5D=Serum%20Institute%20of%20India%20Pvt.%20Ltd.&search_api_views_fulltext=&field_vaccines_number_of_doses=&p age=1)