



INFORME TÉCNICO Nº 01/2022 COVID 19 – VACINA PFIZER PEDIÁTRICA (5 a 11 Anos)

INFORMAÇÕES SOBRE A VACINA PFIZER:

- Vacinação de crianças de 5 a 11 anos (5 a < de 12 anos)
- **IMPORTANTE:** conferir a **faixa etária** na hora da aplicação.
- Criança deverá estar acompanhada do responsável legal. Aguardar 20 minutos após aplicação.
- Frasco multidose: 10 doses
- Dose a aplicar: **0,2ml** - IM deltoide esquerdo.
- Intervalo de 8 semanas entre as doses (D1 e D2)
- Validade após diluição: 12h. (Registrar data e hora no frasco)
- Intervalo de 15 dias entre as vacinas de Rotina.
- Criança que completar 12 anos entre a D1 e D2 completar esquema com Vacina PFIZER PEDIÁTRICA.
- Reações frequentes: Dor, vermelhidão, leve edema local. fadiga, cefaleia, mialgia e calafrios.

ORIENTAÇÃO SOBRE PREPARO E DILUIÇÃO:

- Devem ser mantidas e manuseadas na temperatura usual (+2 a +8 C)
- Inverter o frasco da Vacina 10 x antes da diluição.
- Realizar antisepsia da borda do frasco e flaconete de SF0,9% com álcool 70% (seco).
- A diluição deverá ser feita com seringa de 3 ml com agulha 25x7 ou 25x6
- Aspirar do flaconete do SF 0,9% **apenas 1,3 ml. Desprezar** o volume restante de cada flaconete de Soro Fisiológico.
- Diluir a Vacina com **1,3 ml de SF 0,9%**. Inverter o frasco da Vacina 10 x, lentamente para completa diluição.
- Dose a ser aplicada: **0,2 ml.**
ATENÇÃO
- A administração da Vacina deve ser feita, preferencialmente com seringa de 1ml e agulha 25x6 ou 25x7.
- Se a quantidade restante no frasco não for suficiente para a próxima dose descartar.

COMPOSIÇÃO:

PFIZER ADULTO: 30 mcg - **ACIMA DE 12 ANOS. (0,3 ml)** - Validade diluição 6h
PFIZER PEDIÁTRICA: 10 mcg - **5 A 11 ANOS. (0,2 ml)** – Validade diluição 12h